

# Uwaga! HPAI

## ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



# INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia  
**wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce**

**hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność  
i stosować odpowiednie środki bioasekuracji  
minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków  
do gospodarstwa, w szczególności:**

- 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni,  
pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych  
lub pod szczelnym przykryciem,  
uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych,  
do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne  
oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami  
umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,  
w których utrzymywany jest drób.**

## **Hodowco!**

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji  
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,  
wójt/burmistrz/prezydent miasta)  
podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

### **Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:**

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody;  
objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów;  
duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności